

Contenidos

1. Ideas intuitivas.
2. Derivada de una función
3. Tangente a una curva
4. Derivadas de las funciones elementales.
5. Derivadas y operaciones.
6. Regla de la cadena para las funciones compuestas.

Tiempo estimado

10 sesiones

Criterios de Evaluación

1. Reconocer qué curvas corresponden a funciones derivables relacionándolo con la recta tangente.
2. Entender qué es la derivada en un punto y saber calcularla en casos sencillos.
3. Conocer las derivadas de las funciones elementales.
4. Saber obtener las derivadas de las operaciones de las funciones elementales.
5. Aplicar la regla de la cadena para derivar composiciones de las funciones elementales.



□ Resumen

Idea intuitiva de recta **tangente** en un punto de cierta gráfica: recta que la **roza** y en las proximidades sólo tienen en común el punto de contacto.

En un recorrido, la tangente es la recta de **escape** ante la salida de un móvil.

Requisitos de existencia:

1°. **Continuidad**.

2°. **Suavidad**: pendientes laterales coincidentes.

Cuando hay continuidad pero no suavidad se dice que hay **puntos angulosos**.

□ Definición intuitiva. Continuidad y derivabilidad

Decimos que la función f es **derivable** para $x = a$ si la curva $y = f(x)$ tiene tangente para $x = a$. En este caso a su pendiente se la llama **derivada** de la función para $x = a$, escribiéndose:

$$f'(a) = m$$

A la función $x \mapsto f'(x)$ se le llama función derivada.

La pendiente de la tangente está relacionada con la monotonía y los extremos de las curvas suaves:

- En los puntos donde crece la pendiente es positiva.
- En los puntos donde decrece la pendiente es negativa.
- En los puntos extremos la pendiente es cero.

Ideas importantes:

- función derivable = gráfica suaaaave.
- derivada = pendiente de la curva.
- una curva puede ser derivable en unos puntos y en otros no.

Conviene que queden muy claros los siguientes aspectos de nuestro análisis inicial:

Para estudiar la **derivabilidad** de una función f en un valor concreto $x = x_0$ primero estudiamos la continuidad en $x = x_0$.

Nos podemos encontrar tres casos:

1. f es **discontinua** en $x = x_0$.

Tenemos que f **no es derivable** en $x = x_0$.

2. f es **continua** en $x = x_0$.

Hallamos las **derivadas laterales** $f'(x_0-)$ y $f'(x_0+)$

Ahora hay dos posibilidades:

– **2A**: Las derivadas laterales **no coinciden**.

Resulta que f **no es derivable** en $x = x_0$: ¡Punto anguloso!

– **2B**: Las derivadas laterales **coinciden** (m)

Resulta que f es **derivable** en $x = x_0$: $f'(x_0) = m$

2. Derivada de una función.

Las nociones e ideas anteriores son todas intuitivas, desprovistas del rigor propio de las Matemáticas. Y adolecen de una total falta de capacidad de cálculo: sólo hemos hablado de cualidades, no se ha cuantificado nada.

Vamos a ver la definición partiendo de la Tasa de Variación Media.

□ Tasa de variación media.

Sea f una función continua en cada punto del intervalo $I = [a, b]$.

Se llama Tasa de Variación Media de f en el intervalo al número dado por

$$\text{TVM}(f, I) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

☞ Ejemplo: calculemos la TVM de $f(x) = x^2$ en el intervalo $I = [1, 3]$.

$$\text{TVM}(f, I) = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{9 - 1}{3 - 1} = 4$$

La TVM tiene muchas interpretaciones, dependiendo del contexto. Veamos:

- En la gráfica $y = f(x)$ la TVM es la pendiente de la recta secante que une los puntos inicial $A = (a, f(a))$ y el final $B = (b, f(b))$.
- Si la función mide la posición de un móvil en función del tiempo, la TVM es la velocidad media un intervalo de tiempo.
- Si la función mide el tamaño de una población en función del tiempo, la TVM mide la variación de esa población por unidad de tiempo en el período en que se calcule.

□ Derivada en un punto.

Si calculamos la TVM de una función f en un intervalo $I = [x_0, x]$ y ahora hacemos $x \rightarrow x_0$ entonces se obtiene la llamada Tasa de Variación Instantánea en x_0 , que recibe el nombre de derivada.

Sea f definida en un intervalo abierto I y $x_0 \in I$.

Decimos que f es derivable para $x = x_0$ si el límite siguiente existe:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

En ese caso, al límite anterior se le llama derivada de la función para el valor $x = x_0$, y se le designa por $f'(x_0)$.

☞ Ejemplo: hallems la derivada de la función $f(x) = 3x$ en $x = 2$.

Calculemos

$$f'(2) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x - 2)}{x - 2} = 3$$

Así, es $f'(2) = 3$.


¡Atención! Puede ocurrir que dicho límite no exista. En ese caso diremos que f no es derivable para ese valor.

- ☞ **Ejemplo:** comprobemos que para $f(x) = x^2$ es $f'(5) = 10$.
- ☞ **Ejemplo:** estudiemos gráficamente la derivabilidad de f siendo

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ -x + 2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Observamos que es derivable para $x \neq 1$ pero que para $x = 1$ no hay derivada pues apreciamos claramente un punto angular.

Ampliación: calcula los límites laterales que definen la derivada para $x = 1$ y observa que no coinciden: ¡no hay derivada!



Notación.

Existen multitud de símbolos para designar a la derivada de una función en un punto. Pero de ellos son tres los más usados.

Para designar a la derivada de la función $y = f(x)$ para $x = x_0$ hay varias notaciones. Aquí la usual, la notación de operador y la notación diferencial:

Notación de operador: $f'(x_0) = Df(x_0) = \frac{dy}{dx}(x_0)$

En las Ciencias Experimentales la notación diferencial es la más usada, al resumir perfectamente qué es la derivada e indica las variables.

Esta última se lee "la derivada de y respecto de x para el valor x_0 ". Es una notación debida al matemático y filósofo Leibniz. Es la más compleja a la hora de escribir, pero también es la más completa y la que da más información.

Función derivada.

En muchas ocasiones es necesario conocer la derivada de una función en varios de sus puntos. Consideremos, por ejemplo, la función $f(x) = x^2$. Si deseamos calcular $f'(-5)$, $f'(-1)$, $f'(0)$, $f'(1)$ y $f'(8)$, en lugar de calcular estas derivadas aplicando la definición punto a punto, es preferible obtener una fórmula general:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^2 - x_0^2}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(x + x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x + x_0) = 2x_0$$

Tenemos así que:

$$f'(x) = 2x$$

Ahora calculamos la derivada en esos puntos sustituyendo en esta fórmula.

Y observemos que esa fórmula define una función, que a cada valor de x le asocia la derivada de f para dicho valor de x .

Se llama función derivada de la función f a la definida mediante $x \rightarrow f'(x)$ para aquellos valores en los que es f es derivable, y se designa por $f'(x)$.

Dada la función $y=f(x)$ con dominio D , al conjunto $D' = \{x \in D : f \text{ es derivable en } x\}$ se le llama dominio de derivabilidad.

- ☞ **Ejemplo:** comprueba que la función derivada de $f(x) = 2x$ es la definida por $f'(x) = 2$.

□ Derivadas sucesivas

La derivada f' es una función y, a su vez, puede intentar derivarse. A la función derivada de f' se la llama derivada segunda de f y se la designa por f'' .

A una función f podemos asociarle, derivando sucesivamente, las funciones derivadas f', f'', f''', \dots . A éstas se les llama derivadas sucesivas de f .

$$f \xrightarrow{D} f' \xrightarrow{D} f'' \xrightarrow{D} f''' \xrightarrow{D} \dots$$

☞ **Ejemplo:** es fácil comprobar que

$$f(x) = x^2 \xrightarrow{D} f'(x) = 2x \xrightarrow{D} f''(x) = 2$$

3. Tangente a una curva.

Ahora vamos a usar la derivada para definir la recta tangente a una gráfica:


La tangente a la curva $y = f(x)$ de una función derivable en el punto de abscisa $x = x_0$ tiene de pendiente $m = f'(x_0)$.

Por ello, la ecuación de dicha recta tangente es:

$$y - f(x_0) = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$

☞ **Ejemplo:** obtengamos la ecuación de la recta tangente a la parábola $y = x^2$ para $x = 1$.

- a) Derivamos $f(x) = x^2 \rightarrow f'(x) = 2x$
- b) Sustituimos $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$
- c) Su ecuación es: $y - 1 = 2 \cdot (x - 1) \rightarrow y = 2x - 1$



4. Derivadas elementales

Necesitamos unas reglas que permitan derivar directamente las funciones que más se presentan en el Cálculo. Veremos los casos más elementales

□ Función constante.

La derivada de una función constante en cada punto es cero:

$$f(x) = k \xrightarrow{D} f'(x) = 0$$

Abreviadamente:
 $Dk=0$

□ Función potencial.

La derivada de la función potencial viene dada por:

$$f(x) = x^n \xrightarrow{D} f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

Abreviadamente:
 $Dx^n = n \cdot x^{n-1}$

☞ **Ejemplo:** Dada la función $f(x) = x^4$, su derivada es $f'(x) = 4x^3$.

- ☞ **Ejemplo:** Dada la función $f(x) = x$, su derivada es $f'(x) = 1$.
- ☞ **Ejemplo:** Dada la función $f(x) = x^2$, hallemos la derivada para $x = 4$:
- Derivamos: $f(x) = x^2 \xrightarrow{D} f'(x) = 2x$.
- Sustituimos: $f'(4) = 2 \cdot 4 = 8$
- ☞ **Ejemplo:** Para derivar $f(x) = \sqrt{x^5}$ podemos proceder así:

$$D(\sqrt{x^5}) = D(x^{\frac{5}{2}}) = \frac{5}{2}x^{\frac{3}{2}} = \frac{5}{2}\sqrt{x^3}$$

□ Función exponencial.

La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial:

$$f(x) = e^x \xrightarrow{D} f'(x) = e^x$$

Abreviadamente:

$$D e^x = e^x$$

□ Función logaritmo.

La derivada de la función logaritmo neperiano viene dada por:

$$f(x) = \ln x \xrightarrow{D} f'(x) = \frac{1}{x}$$

Abreviadamente:

$$D \ln x = \frac{1}{x}$$

5. Álgebra de derivadas

□ Derivada de una suma o resta.

La derivada de una suma (resta) es igual a la suma (resta) de las derivadas de los términos que intervienen:

$$D(f \pm g) = f' \pm g'$$

- ☞ **Ejemplo:** $D(x^3 - x^2 + 5) = D(x^3) - D(x^2) + D(5) = 3x^2 - 2x$
- ☞ **Ejemplo:** La derivada de la función $f(x) = x + e^x$ es la función

$$f'(x) = 1 + e^x$$

□ Derivada de una constante por una función.

La derivada del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la derivada de la función:

$$D(k \cdot f) = k \cdot f'$$

- ☞ **Ejemplo:** $D(5 \ln x) = 5 \cdot (\ln x)' = 5 \cdot \frac{1}{x} = \frac{5}{x}$

- **Ejemplo:** calculemos

$$D(5x^2 + 10x - 5) = 10x + 10$$

□ Derivada de un producto.

La derivada de un producto de dos funciones es igual a la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda:

$$D(f \cdot g) = f' \cdot g + f \cdot g'$$

☞ Ejemplo: obtengamos la siguiente derivada

$$D(x \cdot e^x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x = e^x(1 + x)$$

☞ Ejemplo: calculemos $y'(1)$ para la función dada por $y = x \ln x$.

$$y'(x) = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 \rightarrow y'(1) = \ln 1 + 1 = 1$$

□ Derivada de un cociente.

La derivada de un cociente de dos funciones es igual a la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador, todo ello dividido por el cuadrado del denominador:

$$D\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

☞ Ejemplo: Calculemos

$$D\left(\frac{x^3}{x-2}\right) = \frac{3x^2 \cdot (x-2) - x^3 \cdot 1}{(x-2)^2} = \frac{2x^3 - 6x^2}{(x-2)^2}$$

☞ Ejemplo: Calculemos

$$D\left(\frac{x^2}{x-3}\right) = \frac{2x \cdot (x-3) - x^2 \cdot 1}{(x-3)^2} = \frac{x^2 - 6x}{(x-3)^2}$$

6.Regla de la Cadena

Aún nos falta una regla que nos permita obtener la derivada de una composición de funciones. Por ejemplo, ¿cómo hallar la función derivada de $y = \sqrt{2x+5}$ o de $y = \ln(x^2+1)$?

Como vemos, se trata de funciones compuestas. El siguiente resultado, que permite derivar talas funciones, tiene una demostración muy complicada. Nosotros nos limitaremos a conocer cómo se aplica en la práctica con las funciones elementales que estamos estudiando.

Aquí tenemos la denominada **regla de la cadena**, que necesitaremos para derivar composiciones de funciones elementales:

Si f y u dos funciones derivables, entonces la función definida mediante

$$x \mapsto f[u(x)]$$

es derivable en cada x de su dominio y se tiene que es

$$Df[u(x)] = f'[u(x)] \cdot u'(x)$$

Podemos construir una nueva tabla de derivadas:

$$D(u)^n = nu^{n-1} u'$$

$$D\sqrt{u} = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$$

$$De^u = u' e^u$$

$$D\ln(u) = \frac{u'}{u}$$

- ☞ Ejemplo: para derivar $y = e^{x^2+1}$, observamos que es una composición.
Por la regla de la cadena:

$$y' = e^{x^2+1} \cdot 2x$$

- ☞ Ejemplo: si $y = \sqrt{x^2 + 4}$ su derivada es

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 4}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}$$

- ☞ Ejemplo: si $y = \ln(x^2 + 3x - 2)$, aplicando la regla de la cadena

$$y' = \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \cdot (2x - 3) = \frac{2x - 3}{x^2 - 3x + 2}$$

- ☞ Ejemplo: si $y = (x^2 + x - 1)^3$, aplicando la regla de la cadena

$$y' = 3(x^2 + x - 1)^2 \cdot (2x + 1)$$


- ☞ Ejemplo: si $y = 3x e^{5x}$, su derivada viene dada por

$$y' = 3e^{5x} + e^{5x} \cdot 5 \cdot 3x = e^{5x} (3 + 15x)$$


Observa que en esta última hemos aplicado la Regla de la Cadena junto con la reglas del producto.

Ejercicios


1. Dada la siguiente gráfica, haz un esquema que recoja los puntos en los que la derivada no existe, en los que es cero y los intervalos de signo de la derivada




2. Ídem:



3. Ídem:



4. Observa la siguiente gráfica:



Es la correspondiente a la función definida por

$$y = |x^2 - 4|$$

Haz un esquema en el que se recoja los mismos puntos en las cuestiones anteriores.

5. Escribe la ecuación de la recta tangente a la curva

$$y = x^4 - x^3 + x + 1$$

en el punto con $x_0 = 1$.

Sugerencia: recuerda la ecuación punto-pendiente de una recta:


$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

6. Consideremos la curva

$$y = x^3 - 18x^2 + 6x + 10$$

- Obtengamos la ecuación de la tangente para $x = -1$.
- ¿En qué puntos la recta tangente es horizontal?
- Estudiamos si la tangente en algún punto es paralela a $6x - y + 1 = 0$.

7. En la gráfica de la parábola siguiente:



- a) Sin hacer ningún cálculo señala qué signo tiene la derivada de la función en los puntos

$$A = (-1, -3), B = (1, -3)$$

- Sabiendo que la ecuación de la parábola es $y = x^2 - 4$, obtén la ecuación de la recta tangente en esos puntos.
- Comprueba que la tangente es horizontal en el vértice de la parábola.
- ¿En qué punto de la parábola la tangente es paralela a la recta de ecuación $y = 4x - 3$?

8. Dada la función definida por

$$f(x) = x^2 - 4x$$

- Obtén su derivada primera.
- Halla la ecuación de la recta tangente para $x = 0$.
- ¿En qué punto la tangente es paralela a $2x - y = 1$?

9. Dada la función $f(x) = x^2 + 5x - 3$, obtén $f(2)$, $f'(2)$ y $f''(2)$.

10. Consideremos

$$f(x) = x^2 + bx + c$$

Hallemos b y c sabiendo que es

$$f(1) = 2 \text{ y } f'(0) = -2$$

11. En la función

$$f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 3$$

Hallemos a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(1, -3)$ y que es $f''(0) = 2$.

12. Calculemos a y b en la función

$$f(x) = \frac{ax^2 + b}{x}$$

sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(-1, 2)$ y que tiene un extremo relativo para $x = \sqrt{2}$.

13. Calculemos a y b en la curva

$$y = x^3 + ax^2 + bx - 2$$

sabiendo que $(-2, 2)$ es un extremo relativo.

14. Dada la función

$$f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 6$$

- Halla $f'(x)$ y estudia su signo.
- Deduce de lo anterior los intervalos de monotonía de la gráfica de f .
- ¿En qué puntos tiene la gráfica de f los extremos relativos?
- Obtén el límite en el infinito y esboza su gráfica.

15. Ídem para

$$f(x) = \frac{4x}{1+x^2}$$

16. *Comprueba que la recta de ecuación $y = x$ es tangente a la gráfica $y = \ln x$.

17. Dada la función definida a trozos por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- Estudia su continuidad
- ¿Es derivable para $x = 1$?
- Obtén la función derivada y halla $f'(0)$ y $f'(1)$.

18. Dada la función

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{si } x \leq -1 \\ x^2 - 2x & \text{si } x > -1 \end{cases}$$

- Dibuja su gráfica.
- ¿Es derivable para $x = -1$?
- Calcula la derivada para $x \neq 2$ y obtén las derivadas laterales en $x = 2$.
- Obtén la recta tangente para $x = 2$ y $x = -1$.

19. Consideremos la función definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & \text{si } x \leq 2 \\ x^3 - 2x^2 + 3 & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- Analiza la continuidad.
- Estudia su derivabilidad y obtén $f'(x)$.
- Halla la ecuación de la recta tangente para $x = 0$ y para $x = 2$.

20. Comprueba que la función $y = 3 \sin x - 4 \cos x$ verifica la ecuación $y'' + y = 0$.

Idem. que la función $y = x \cdot e^x$ verifica la ecuación $y'' - 2y' + y = 0$.

21. Un cuerpo se mueve en línea recta, de modo que la distancia a un punto de esa recta desde el que se observa viene dada por:

$$r(t) = \ln(20 + 8t - t^2) \quad , \quad 0 \leq t \leq 10$$

- Obtén $\frac{dr}{dt}(t)$. ¿Qué interpretación tiene ésta?
- ¿El cuerpo se detiene en algún momento? ¿A qué distancia del punto de observación?

22. El número de insectos en una colonia viene dado por

$$N(t) = 100 + e^{10t-t^2} \quad , \quad t \geq 0$$

- Calcula $\frac{dN}{dt}(t)$.
- ¿Qué significado tiene la expresión anterior?

REGLAS DE DERIVACIÓN

23. Obtén las derivadas de las siguientes funciones polinómicas:

a) $y = x^2 - 5x + 4$ b) $y = 2x^3 - x^2 + 3x$

c) $y = x^4 + 3x^2 - 5$ d) $y = x^3 - 9x + 3$

e) $y = x^4 - 4x^3 + x$ f) $y = x^3 + \frac{2}{2}x^2 - 1$

24. Obtén las derivadas sucesivas de las siguientes funciones:

a) $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 7$

b) $y = -2x^3 + 8x^2 - x + 2$

c) $y = 3x^4 - 5x^3 + 4x^2 + 6x - 1$

25. Halla la función derivada de:

a) $f(x) = x^2 e^x$ b) $g(x) = 3x e^x$

c) $u(x) = x \ln x$ d) $v(x) = e^x \ln x$

26. Deriva los siguientes cocientes:

a) $a(x) = \frac{2}{x}$ b) $b(x) = \frac{3}{x^2}$

c) $c(x) = \frac{3x+1}{2x+1}$ d) $d(x) = \frac{3x-5}{x^2+1}$

e) $f(x) = \frac{5x^2}{x-1}$ f) $g(x) = \frac{x+1}{x^2-4x}$

g) $u(x) = \frac{3x^2+1}{x+2}$ h) $u(x) = \frac{e^x-1}{e^x+1}$

27. Obtén la función derivada de:

a) $f(x) = \sqrt[3]{x^5}$ b) $f(x) = \frac{2}{x^4}$

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{x^3}}$ d) $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{\sqrt{x}}$

28. Obtén la derivada aplicando las reglas:

a) $y = 3x - 5 \ln x$ b) $y = -2x^2 \ln x$

c) $y = x^4 e^x$ d) $y = \frac{x^2 - x}{x^2 + 1}$

29. Calcula la derivada de las siguientes funciones:

d) $y = 5x - 3e^x$

e) $y = \frac{e^x}{x+1}$

f) $y = \frac{\ln x}{x^2}$

g) $y = (3x^2 - 2x + 1) \cdot e^x$

30. Obtén las derivadas de las siguientes funciones, aplicando la regla de la cadena:

a) $y = e^{x^2-3x}$ b) $y = \sqrt{x^2 - 3x}$

c) $y = (x^2 - 3x)^4$ d) $y = \ln(x^2 - 3x)$

31.* Obtén $f'(x)$ para:

a) $y = (2x - e^x)^3$ b) $y = \ln(x^3 + 1)$

c) $y = \sqrt{2x - 1}$ d) $y = e^{x-1}$

32.* Halla la derivada de las siguientes funciones:

a) $y = x \cdot e^{3x}$ b) $y = x^2 \ln(x^3 + 1)$

c) $y = \frac{\ln 2x}{x}$ d) $y = x^3 - \ln(2x)$

e) $y = \frac{e^{2x}}{x-1}$ f) $y = x\sqrt{4x+1}$

33. Obtén la derivada n -ésima de:

a) $y = e^{2x}$

b) $y = \ln(3x - 1)$

Cuestiones

1. Un objeto se mueve en línea recta, de modo que el espacio recorrido (m) está en función del tiempo (s) medido desde el inicio del movimiento según:

$$e(t) = t^2 + 2t \quad , \quad 0 \leq t \leq 10$$

- ¿Qué espacio lleva recorrido cuando han transcurrido 3 segundos?
 - ¿Cuál es la velocidad media del cuerpo en el intervalo de tiempo $I = [3, 5]$?
 - Obtén la velocidad que lleva en el instante $t = 4$.
2. Un móvil recorre una recta de modo que la distancia al punto de observación, en función del tiempo, viene dado por:

$$s(t) = 15t + 4$$

Demuestra que lleva una velocidad constante.

3. La siguiente función nos proporciona la distancia de un móvil que sigue una línea recta hasta un punto de observación de ella.

$$s(t) = t^3 - 4t^2 + 3t - 3 \quad , \quad t \geq 0$$

Calcula $s(3)$, $\frac{ds}{dt}(3)$ y $\frac{d^2s}{dt^2}(3)$. ¿Qué significado tiene cada uno de esos tres números?

4. Un objeto se lanza hacia arriba, poniéndose en ese instante en marcha un cronómetro hasta que cae al suelo. La altura (en metros) a la que se encuentra a los t segundos de ser lanzado viene dada por:

$$f(t) = 60 + 20t - 5t^2$$

- ¿Al cabo de cuánto tiempo cae el objeto al suelo? ¿Para qué valores de t es válida la fórmula anterior?
- Calcula la velocidad media en el intervalo de tiempo $I = [3, 5]$.
- Obtén $\frac{df}{dt}(t)$ y $\frac{d^2f}{dt^2}(t)$. ¿Qué significado tienen estas expresiones?
- ¿Con qué velocidad fue lanzado el cuerpo? ¿A qué altura se encontraba?
- ¿Con qué velocidad toca al suelo al caer?
- ¿En qué instante alcanza la altura máxima? ¿Cuál es esa altura máxima?

5. Dada la función $f(x) = x^3$:

- Comprueba que la tangente a su gráfica en el punto $P = (1, 1)$ es la recta $y = 3x - 2$.
- Comprueba que esa recta corta a la curva en el punto $Q = (-2, -8)$.

6. Dada la función $f(x) = x^2 - 3x$ obtén su tasa de variación media en el intervalo $I = [1, 5]$.

7. La curva de ecuación $y = f(x)$ tiene en el punto de abscisa $x = 1$ como recta tangente $2x - y + 4 = 0$.


Averigua $f(1)$ y $f'(1)$.

8. Si f es una función polinómica, ¿cuál es la primera derivada que es idénticamente nula?

9. Escribe dos funciones cuya derivada sea $y' = 2x$. ¿Cuántas funciones así existen?

10. Dibuja la gráfica de una función que sea continua pero no derivable para $x = 3$. ¿Cómo se denomina a ese punto?

11. A continuación tenemos dibujada la gráfica de la función $y = 1 + |x - 2|$.



¿Qué pendiente tiene la recta tangente para $x = 2$?

- 12.

Autoevaluación

1. Obtén la derivada de las siguientes funciones:

a) $y = x^3 \operatorname{sen} x$

b) $y = \frac{x^3}{2x + 1}$

c) $y = x^5 e^x + 1$

d) $y = 3 \ln x - 5x + 1$

2. Halla la función derivada usando la Regla de la Cadena:

a) $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

b) $g(x) = \ln(\operatorname{sen} x)$

c) $u(x) = 3x e^{2x}$

d) $v(x) = \frac{x^2}{\cos 4x}$

3. Consideremos la función f definida por

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x^2 - x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- Estudia la continuidad de la función.
- Calcula la derivada directamente para $x \neq 1$, y determina las derivadas laterales para $x = 1$. ¿Es derivable la función para este valor?
- Obtén la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función para $x = 3$.


4. Halla a y b sabiendo que la función $y = x^2 + ax + b$ pasa por el punto $(2, -1)$ y tiene un extremo relativo para $x = 1$.

5. Dada la función

$$f(x) = x^3 - 3x$$

- Obtén las derivada primera y segunda.
- Estudia cuándo es positiva, negativa o cero (ceros e intervalos de signo) la derivada primera.
- Deduca de lo anterior los intervalos de monotonía de la gráfica de f .
- ¿En qué puntos tiene la gráfica de f los extremos relativos?
- Halla los límites en el infinito de $y = x^3 - 3x$ esboza la curva.

6. Consideremos la función cuya gráfica $y = f(x)$ es:



Haz un esquema en el que se recoja:

- los puntos en los que la derivada no existe.
- los puntos en los que la derivada es cero.
- los intervalos de signo de la derivada.

Autoevaluación

1.

a) Derivada de un producto:

$$y' = 3x^2 \operatorname{sen} x + x^3 \cos x$$

b) Derivada de un cociente:

$$y' = \frac{3x^2(2x+1) - 2 \cdot x^3}{(2x+1)^2} = \frac{4x^3 + 3x^2}{(2x+1)^2}$$

c) Derivada de una resta y producto:

$$y' = 5x^4 e^x + x^5 e^x + 0 = e^x (5x^4 + x^5)$$

d) Derivada de una suma/resta:

$$y' = \frac{3}{x} - 5 = \frac{3 - 5x}{x}$$

2.

a) Derivada de una raíz (regla de la cadena):

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

b) Derivada de un logaritmo (regla de la cadena):

$$y' = \frac{-\cos x}{\operatorname{sen} x} = -\cot x$$

c) Derivada de un producto y regla de la cadena:

$$y' = 3 \cdot e^{2x} + 3x \cdot e^{2x} \cdot 2 = e^{2x} (3 + 6x)$$

d) Derivada de un cociente y regla de la cadena:

$$y' = \frac{2x \cos 4x + 4x^2 \operatorname{sen} 4x}{\cos^2 4x}$$

3.

a) f sólo puede ser discontinua para $x = 1$ (separa-fórmulas). Veamos qué ocurre en él:

$$x = 1$$

VALOR: $f(1) = 1^2 = 1$

LÍMITES:
$$\begin{cases} f(1-) = 1^2 = 1 \\ f(1+) = 2 \cdot 1^2 - 1 = 1 \end{cases}$$

Concluimos que es continua en $x = 1$.

b) Podemos derivar directamente si $x \neq 1$:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } x < 1 \\ 4x - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

c) Para $x = 1$, como es continua, podemos hallar las derivadas laterales así:

$$\text{D.L. } \begin{cases} f'(1-) = 2 \cdot 1 = 2 \\ f'(1+) = 4 \cdot 1 - 1 = 3 = 1 \end{cases}$$

Al no coincidir, tenemos que no es derivable para este valor (se trata de un punto anguloso).

d) La ecuación de la recta tangente para $x = 3$ es

$$y - f(3) = f'(3)(x - 3)$$

Sustituyendo: $f(3) = 15$ y $f'(3) = 12$. Así que la fórmula nos queda:

$$y - 15 = 12(x - 3) \rightarrow y = 12x - 21$$

4. Derivemos: $y = x^2 + ax + b \rightarrow y' = 2x + a$

si pasa por el punto $(2, -1)$, entonces para $x = 2$ es $y = -1$:

$$4 + 2a + b = -1 \text{ [*]}$$

si tiene un extremo relativo para $x = 1$, entonces para $x = 1$ es $y' = 0$:

$$2 \cdot 1 + a = 0 \rightarrow a = -2$$

Sustituyendo esto en [*] obtenemos $b = -1$.

5.

a) $f(x) = x^3 - 3x'(x) = 3x^2 - 3 \rightarrow f''(x) = 6x$


b) Ceros de la derivada:

$$3x^2 - 3 = 0 \rightarrow 3x^2 = 3 \rightarrow x^2 = 1 = \pm 1$$

Intervalos de signo:



c) Intervalos de monotonía de la gráfica de f :



d) Se deduce que hay:

Máximo relativo en $x = -1 \rightarrow y = 2$

Mínimo relativo en $x = 1 \rightarrow y = -2$

e) Límites en el infinito por la regla del grado:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (-\infty)^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = (+\infty)^3 = +\infty$$

6. Tenemos en cuenta:

- si la función crece la derivada es positiva
- si la función decrece la derivada es negativa
- en los puntos angulosos la derivada no existe
- en los extremos suaves la derivada es cero.

Así el esquema de la derivada es:

